

***Teucrium franchetianum* Rouy & Coincy**

LAMIACEAE

Chamaephyte, plante cespiteuse, souche ligneuse, ramifié. Tiges procumbentes de jusqu'à 20 cm de longueur. Feuilles opposées, complètes ou sous entières, éternelles. Inflorescences dans des grappes condensées à des jacées terminales, ovoïdes. Corolle de 14-15 mm de longueur, jaunâtre.



Francisco J. Sánchez Saorín

Distribution

Endémisme du sud-est Ibérien, propre du nord-est de Murcia et du sur-orient d'Albacete. À Murcia il est distribué par le centre. Il habite dans des bruyères et champs d'alfa sur les sols peu profonds, pierreux et dégradés, dans les étages thermo méditerranéens et ombrotype semi-aride / aride.



Phénologie

Fl.	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc
Fr.	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc
Em.	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc

Description des semences

Taille (mm x mm)	0.7x0.5	
Masse (mg)	0.97	
N° cotylédons	dicotylédone	
Contour	piriforme	
Section	Plan-convexe	
Couleur	Marron	
Structures extérieures	aucunes	
Ornementation	granulée	
Type de semence	endosperme	
Type d'embryon	Axial, lineal	
Unité de dissémination	Fruit	Irene Torres Ramos
Type de dissémination	anemocore	

Récolte

L'unité de dispersion c'est le fruit qui tombera quand il sera mûr et le vent les disperse. La récolte des fruits c'est fait à partir de juin, quand ils sont mûrs.

Bibliographie

- Sánchez Gómez P. et al. (2.003). NUEVA FLORA DE MURCIA. D.M.
- Sánchez Gómez P., M. A. Carrión Vilches, A. Hernández & J. Guerra (2.002) LIBRO ROJO DE LA FLORA SILVESTRE PROTEGIDA DE LA REGIÓN DE MURCIA. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Dirección General del Medio Natural.